



**Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України**

**Факультет
ветеринарної
медицини**

НДІ Здоров'я тварин



**«ЄДИНЕ ЗДОРОВ'Я – 2022»
Матеріали Міжнародної наукової конференції**



**22-24 вересня 2022 р.
НУБіП України, м. Київ**

УДК 636.2.09:616.98:579.62

ЛІКУВАННЯ ЗА НЕКРОБАКТЕРІОЗУ КОРІВ

Ситнік В.А., кандидат ветеринарних наук, доцент

*Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ*

Некробактеріоз – інфекційне захворювання, яке характеризується запаленням суглобів, гнійно-некротичними враженнями шкіри (найчастіше нижніх частин кінцівок), слизових оболонок, а інколи і паренхіматозних органів. Хворіє найчастіше ВРХ старше 1,5 року – молочні корови та бички на відгодівлі. Дуже сприятливими до захворювання телиці та нетелі, завезені до наших господарств з-за кордону. Некробактеріоз може виникати у будь – яку пору року, але найчастіше у дощову.

Економічні витрати через хвороби кінцівок варіюють у кожному випадку в залежності від стала. Грошові витрати можуть вираховуватися тисячами гривень на корову на рік. Хвороба спричинює економічні збитки через зниження багатьох показників, у тому числі молочної продуктивності на 5-25 %, інтенсивного росту на 15–25%.

Проводили порівняльний аналіз доступних нам схем лікування та профілактики некробактеріозу у великої рогатої худоби. Підбір та розробку ефективної схеми лікування некробактеріозу проводили у господарстві неблагополучному щодо цього захворювання.

Лікування некробактеріозу великої рогатої худоби повинно базуватись та включати санітарно – хірургічну обробку хворих ратиць, обов'язкову антибіотико- та симптоматичну терапії місць вражень.

Тварин надійно фіксують та проводять механічне очищення ураження ділянок.

Схема лікування включає у себе:

- циркулярну блокаду 0,5 % розчином новокаїну;
- санацію розчищеного місця та зупинка кровотечі Вет – Оксом – 1000 у розведенні 1:1 із фізіологічним розчином;
- присипання рани Ранойод з наступним нанесенням мазі Вишневського у вигляді просоченого тампону та нанесення пов'язки. Зміна пов'язки один раз на 3 дні;
- застосування вітамінного та підтримуючого препарату Фос-Бевіт;
- антибіотика препаратом Цефтіоклін. Вводять внутрішньом'язово один раз на добу у дозі 1 мл препарату на 50 кг маси тіла протягом 5 діб;
- внутрішньом'язове введення препарату Кефен 1 раз на добу з розрахунку 0,3 мл на 10 кг маси тіла впродовж 3 діб;
- застосування копитних ван із 5–10 % розчином мідного купоросу.

Запропонована схема лікування дозволяла забезпечувати достатній лікувальний ефект, як при проведенні дослідів, так і у господарстві де у великої рогатої худоби виявляли клінічні ознаки, які притаманні некробактеріозу.